

網走・北見・紋別地方

農業気象情報

令和6年8月前半

網走地方気象台
令和6年8月20日

【8月1日から15日までの気象概況】

事項	概況
天気	この期間は、低気圧を含む気圧の谷の影響により曇りや雨が多かった。

【旬・月の要素別平年差（比）】

要素	平年差（比）	
気温	上旬	雄武、興部、西興部、紋別、紋別小向、滝上、湧別、遠軽、佐呂間で平年並の他は、平年より高かった。
降水量	上旬	斜里、境野で平年よりかなり多く、宇登呂、小清水、山園、東藻琴、津別二又、北見、仁頃山、留辺蘂、置戸常元で平年より多く、女満別、遠軽、丸瀬布、白滝、上藻別、紋別小向、紋別で平年より少ない他は平年並であった。
日照時間	上旬	雄武、興部で平年よりかなり少なく、西興部、滝上、白滝、紋別、湧別、遠軽、生田原、佐呂間で平年より少ない他は、平年並であった。

《日々の概況 前半》

日付	気象的要因	天気
1日	前線を伴った低気圧がサハリン付近に進み、曇り時々晴れで、所により雨が降った。	曇一時雨後晴
2日	前線を伴った低気圧が近づき、曇り時々晴れで、所により雨が降った。	曇一時雨後晴
3日	前線を伴った低気圧を含む気圧の谷の中、曇り時々晴れで、所により雨が降った。	晴後一時曇
4日	前線を伴った低気圧が通過し、曇りで、時々雨が降った。	雨時々曇
5日	低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、所により雨が降った。	曇時々雨
6日	高気圧の張り出しの中、晴れで、時々曇った。	晴
7日	気圧の谷の中、概ね晴れたが、所により雨が降った。	晴
8日	低気圧を含む気圧の谷の中、雨で、時々曇った。	雨
9日	気圧の谷の中、曇りで、時々雨が降った。	曇時々晴後雨、雷を伴う
10日	前線を含む気圧の谷の中、曇りで、所により雨が降った。	曇一時晴後雨、霧を伴う
11日	前線を含む気圧の谷の中、曇りで、時々雨が降った。	雨時々曇
12日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
13日	高気圧の張り出しの中、晴れた。	晴
14日	台風から変わった熱帯低気圧を含む気圧の谷の中、晴れ時々曇りで、一時雨が降った。	晴後一時曇
15日	台風から変わった熱帯低気圧を含む気圧の谷の中、曇りで、時々雨が降った。	曇時々雨

※ 天気は、網走の日中（06時～18時）の天気概況。

【旬・月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値】

・8月上旬

	気 温 (°C)				降 水 量 (mm)				日照時間 (h)			
	旬平均	平年値	平年差	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級	旬合計	平年値	平年比	階 級
網 走	21.8	19.8	+2.0	高い	34.5	34.4	100%	平年並	52.6	54.9	96%	平年並
雄 武	19.3	19.1	+0.2	平年並	36.0	41.5	87%	平年並	15.9	45.5	35%	かなり 少ない
紋 別	20.3	19.6	+0.7	平年並	10.0	40.1	25%	少ない	20.8	48.3	43%	少ない

・観測値は後日一部訂正されることがあります。

(注1) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1991年～2020年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。


【極 値 更 新】 (8月15日までに気象官署・地域気象観測所で8月としての第1位を更新した記録)

項 目	地 点 名
日最大1時間降水量(mm)	境野 49.5(9日)
日最大10分間降水量(mm)	山園 10.5(4日)、生田原 17.0(9日)


2024年8月 アメダス気象経過図（紋別地方）

アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


雄武




紋別




興部




西興部



紋別小向



湧別




※ 紋別小向では、日照時間の観測を行なっていません。


2024年8月 アメダス気象経過図 (紋別地方)

アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


滝上




遠軽



白滝




生田原




2024年8月 アメダス気象経過図（北見地方）

アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日



2024年8月 アメダス気象経過図（網走地方）


アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日




2024年8月 アメダス気象経過図（網走地方）

アメダス 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月31日


宇登呂




女満別




小清水




斜里



美幌





津別





※ 女満別では、日照時間の観測を行なっていません。

2024年8月上旬 気象分布図 (平均気温)





注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年8月上旬 気象分布図（降水量）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「[]」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

2024年8月上旬 気象分布図（日照時間）



注1) 「×」は欠測、「//」は平年値なし、「] 」や「) 」付きの観測値は欠測を含んでいることを示しています。

地域気象観測気温月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年8月

単位：℃ 4/4頁

観測所名	津別		
	日付	平均	最高
1	22.2	28.3	17.0
2	25.5	31.8	20.7
3	26.0	32.6	20.7
4	21.1	28.8	15.8
5	17.5	19.8	15.4
6	23.7	30.7	17.6
7	26.2	32.4	19.5
8	22.9	25.0	20.8
9	23.3	31.2	19.7
10	19.8	24.0	16.8
11	17.9	21.8	16.3
12	24.0	32.6	15.4
13	26.2	31.9	20.6
14	25.5	33.7	20.4
15	19.6	21.9	17.5
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
月極値			
起日			
上旬平均	22.8	28.5	18.4
中旬平均			
下旬平均			
月平均			
0℃未満日数			
25℃以上日数			
30℃以上日数			
35℃以上日数			
積算気温			

地域気象観測日照時間月報

網走・北見・紋別地方 (17)

2024年8月

単位：h 2/2頁

観測所名 日付	留辺蘂	境野	美幌	津別
1	7.9	5.4	6.7	6.2
2	5.0	7.6	8.0	8.5
3	5.1	8.3	8.9	8.8
4	1.4	1.2	1.7	3.3
5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	9.2	10.5	11.9	9.7
7	8.5	9.8	12.1	10.0
8	0.4	0.5	0.0	0.0
9	4.0	4.8	4.9	4.6
10	0.0	0.0	0.0	0.1
11	0.1	0.0	0.0	0.0
12	11.5	10.6	12.4	10.4
13	12.4	11.2	12.0	11.2
14	6.6	9.8	10.3	8.4
15	0.0	0.0	0.0	0.0
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
旬合計 上旬	41.5	48.1	54.2	51.2
旬合計 中旬				
旬合計 下旬				
月合計				
0.1時間未満日数				

北海道地方 1か月予報

(8月17日から9月16日までの天候見通し)

令和6年8月15日
札幌管区气象台発表

<特に注意を要する事項>

北海道オホーツク海側・太平洋側では、期間の前半は気温がかなり高くなる可能性があります。

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、北海道太平洋側では、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


向こう1か月の平均気温は、北海道日本海側・太平洋側で高い確率70%、北海道オホーツク海側で高い確率60%です。日照時間は、北海道太平洋側で平年並または多い確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、北海道日本海側で平年並または高い確率ともに40%、北海道オホーツク海側で平年並の確率50%、北海道太平洋側で高い確率60%です。2週目は、北海道日本海側・オホーツク海側で高い確率70%、北海道太平洋側で高い確率80%です。3～4週目は、高い確率60%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率（％）>



<予報の対象期間>

1か月 : 8月17日（土）～ 9月16日（月）
 1週目 : 8月17日（土）～ 8月23日（金）
 2週目 : 8月24日（土）～ 8月30日（金）
 3～4週目 : 8月31日（土）～ 9月13日（金）

<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は8月22日
 3か月予報：8月20日（火） 14時

<参考資料（平年並の範囲等）>

(1) 30年平均値（向こう1か月の平均気温、降水量等）

	気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (時間)	気温(°C)		
				1週目	2週目	3～4週目
稚内	18.9	132.3	168.6	19.5	19.4	18.6
北見枝幸	18.3	142.8	148.5	19.0	18.9	18.0
羽幌	19.6	140.5	180.6	20.7	20.3	19.1
雄武	17.9	142.0	155.4	18.7	18.5	17.6
留萌	19.5	138.5	177.8	20.7	20.3	19.0
旭川	19.2	155.1	151.4	20.8	20.1	18.5
網走	18.7	122.4	166.1	19.5	19.2	18.4
小樽	20.3	139.0	166.6	21.5	21.0	19.8
札幌	20.9	142.3	164.8	22.1	21.7	20.4
岩見沢	19.8	159.4	162.9	21.1	20.6	19.3
帯広	19.0	150.7	131.7	20.0	19.7	18.6
釧路	17.9	155.6	129.9	18.3	18.2	17.7
根室	17.3	150.4	134.7	17.4	17.5	17.2
寿都	20.1	142.6	162.3	21.1	20.8	19.7
室蘭	19.9	174.6	157.9	20.6	20.5	19.7
苫小牧	19.6	198.6	139.2	20.4	20.2	19.3
浦河	19.4	158.9	153.0	20.0	19.9	19.1
江差	21.6	163.2	168.9	22.6	22.2	21.1
函館	20.9	164.4	155.2	22.0	21.6	20.4
倶知安	19.0	142.9	152.5	20.4	19.8	18.4
紋別	18.5	130.0	155.6	19.2	19.0	18.2
広尾	18.0	263.8	124.1	18.6	18.5	17.9

なお、気温、降水量等の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にしてください。

(2) 1991～2020年のデータに基づいた向こう1か月地域平均の気温、降水量等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差(°C)	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
北海道地方	-0.7～+0.6	77～109	94～107
北海道日本海側	-0.7～+0.5	77～114	95～107
北海道オホーツク海側	-0.5～+0.5	69～115	93～109
北海道太平洋側	-0.6～+0.7	81～114	91～110

(3) この予報期間の1週目、2週目、3～4週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1週目	2週目	3～4週目
北海道地方	-0.7～+0.8	-0.7～+0.6	-0.6～+0.5
北海道日本海側	-0.6～+0.7	-0.7～+0.6	-0.6～+0.4
北海道オホーツク海側	-0.7～+0.9	-0.6～+0.9	-0.6～+0.6
北海道太平洋側	-0.7～+0.8	-0.5～+0.7	-0.5～+0.7

<参考資料（利用上の注意）>

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。

北海道地方 3か月予報

(9月から11月までの天候見通し)

令和6年8月20日
札幌管区气象台発表

<予想される向こう3か月の天候>

向こう3か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

この期間の平均気温は、高い確率50%です。

9月 天気は数日の周期で変わるでしょう。

気温は、高い確率50%です。

10月 北海道日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。北海道オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。北海道太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに40%です。


11月 北海道日本海側・オホーツク海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北海道太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

<向こう3か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>


<<気温>>

[北海道地方]



<<降水量>>

[北海道地方]



<次回発表予定等>

1か月予報：毎週木曜日 14時30分 次回は8月22日

3か月予報：9月24日（火） 14時

寒候期予報：9月24日（火） 14時

なお、9月の予報については、新しい資料による次回以降の1か月予報を適宜ご利用ください。

<参考資料（平年並の範囲等）>

(1) 平年値（月・3か月平均気温等）

	気 温(°C)				降 水 量(mm)			
	9月	10月	11月	9月～11月	9月	10月	11月	9月～11月
稚内	17.2	11.3	3.8	10.8	136.7	129.7	121.4	387.7
北見枝幸	16.5	10.3	3.0	9.9	134.9	127.7	124.1	386.7
羽幌	17.4	11.2	4.4	11.0	143.8	152.0	161.1	456.9
雄武	16.0	9.8	2.9	9.6	137.2	92.3	77.4	306.8
留萌	17.2	11.1	4.4	10.9	145.4	131.4	140.0	416.8
旭川	16.4	9.4	2.3	9.4	136.3	105.8	114.5	356.5
網走	16.8	10.9	4.0	10.6	115.0	88.2	58.1	261.3
小樽	18.1	11.8	4.9	11.6	131.7	123.0	152.4	407.1
札幌	18.6	12.1	5.2	12.0	142.2	109.9	113.8	365.9
岩見沢	17.4	10.8	3.9	10.7	142.2	110.4	118.8	372.8
帯広	16.9	10.3	3.5	10.2	140.2	85.7	54.2	280.0
釧路	16.5	11.0	4.7	10.7	153.0	112.7	64.7	330.4
根室	16.2	11.6	5.6	11.2	160.0	126.1	83.2	369.3
寿都	18.1	12.1	5.6	11.9	149.8	128.0	148.2	426.0
室蘭	18.4	12.9	6.4	12.5	156.6	101.8	83.2	341.6
苫小牧	17.8	11.5	4.9	11.4	174.9	113.2	85.7	373.8
浦河	17.7	12.3	6.1	12.0	144.4	117.7	83.4	345.5
江差	19.5	13.7	7.5	13.6	135.6	105.5	118.6	359.8
函館	18.8	12.5	6.0	12.5	150.5	105.6	110.8	366.9
倶知安	16.4	9.7	2.9	9.7	133.3	128.2	182.8	444.3
紋別	16.6	10.5	3.6	10.2	127.6	88.1	64.6	280.2
広尾	16.6	11.3	5.2	11.0	262.6	194.2	127.7	584.4

欠測により平年値を求めるための資料年数（観測値のある年数）が各月毎に異なることなどにより、3か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。

(2) 1991～2020年のデータに基づいたこの予報期間の地域平均気温等の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

要素	予報対象地域	9月	10月	11月	9月～11月
気温平年差(°C)	北海道地方	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.3～+0.6	-0.3～+0.3
	北海道日本海側	-0.5～+0.4	-0.3～+0.4	-0.2～+0.6	-0.2～+0.2
	北海道オホーツク海側	-0.5～+0.4	-0.5～+0.5	-0.4～+0.7	-0.2～+0.4
	北海道太平洋側	-0.5～+0.5	-0.3～+0.3	-0.3～+0.6	-0.3～+0.4
降水量平年比(%)	北海道地方	80～104	92～111	79～110	88～112
	北海道日本海側	75～116	86～104	84～113	91～107
	北海道オホーツク海側	68～96	80～119	70～122	88～104
	北海道太平洋側	84～108	78～119	76～104	90～109

<参考資料（利用上の注意）>

- (1) 気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991～2020年の30年間における各階級の出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。
- (2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30%、40%）の確率しか付けられません。
- (3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の2分の1より多い（少ない）ことを意味します。